


Fractura de ilion

Cuidados posquirúrgicos



El Ilión es uno de los 6 huesos de la cadera que une el fémur de la pierna con la columna. Da soporte para caminar y mantiene protegidos a los órganos de la pelvis como son la vejiga, el colon y el útero. Cuando se fractura puede haber lesiones secundarias en estos órganos u obstruir el paso de heces, orina o cachorros durante el parto.

La corrección de estas fracturas consiste en colocar los fragmentos en su sitio para evitar obstrucciones y fijar los fragmentos con placa y tornillos de manera que den soporte para caminar.

Cuidados posquirúrgicos

- Administrar al paciente el antibiótico y el analgésico que indique su médico veterinario. Nunca dar antiinflamatorios para personas como aspirina y naproxeno.
- Verificar que orine y defaque al menos una vez al día
- El paciente debe estar en una superficie plana de piso no resbaloso y debe evitarse saltos desde muebles, correr sin correa o jugar con otros animales durante al menos 6 semanas
- Dos veces al día colocarlo en un patio o jardín donde pueda defecar. Mínimo 5 minutos sostenido en sus 4 miembros con ayuda de una toalla o arnés, posteriormente permitirle caminar hasta 15 minutos dos veces al día. Después del día 10 posquirúrgico puede caminar con correa de preferencia en pasto.



- Lo primeros tres días se pueden aplicar compresas frías de gel sobre la incisión 5 minutos una vez al día y posteriormente usar compresas calientes. En ocasiones se puede acumular líquido bajo la piel (seroma) en caso de observar esto notificarlo al veterinario
- Reportar: inflamación, fiebre, falta de apetito, si a los diez días posquirúrgicos no apoya, o si apoya y de un día a otro deja de apoyar. Asi como si pasa más de 24 horas sin orinar o defecar.