


Fractura de mandíbula

Tratamiento con fijador esquelético externo



Las fracturas de mandíbula pueden presentarse por traumatismo o ser secundarias a infecciones en el hueso y encía. Cuando son secundarias generalmente son resultado de un traumatismo leve o de una pelea con otro perro.

Existen varios métodos de reparación. El fijador esquelético externo tiene como ventaja principal el bajo costo de implantes y permite una variedad de adaptaciones según la forma y tamaño del paciente. Tienen como desventaja que son poco estéticos, estorbosos y menos estables que otras opciones. La evolución de estos pacientes depende de los cuidados posquirúrgicos, edad y talla del paciente y presencia o ausencia de infección en el hueso.

Recomendaciones generales

- Realizar limpieza dental pre o posquirúrgica y dar antibióticos de amplio espectro
- Mediar de preferencia vía subcutánea (convenia antibiótico de depósito) o intramuscular, para evitar lastimar al paciente o luchar con el al darle medicamentos vía oral
- No utilizar analgésicos de personas nunca (aspirina, naproxen, ketorolaco)
- Evitar peleas con otros animales darles juguetes a morder o alimentos duros
- Administrar alimento blando para cachorro o alto en proteína (revoverly lata o a/d lata) puede ser también cualquier alimento enlatado o su alimento habitual pero previamente remojado para que este blando
- Cada vez que coma enjuagar el fijador externo con agua purificada y secar la piel con una toalla hasta donde sea posible
- Se recomienda una revisión semanal o quincenal con su médico veterinario y mantener estos cuidados tres meses al menos 8 semanas.
- Como complicaciones principales puede haber infecciones de piel, aflojamiento prematuro de implantes, enganchamiento en muebles o rejas
- La consolidación de la fractura tarda aproximadamente 8 semanas durante las cuales se deben tener los cuidados mencionados. Posteriormente se puede programar el retiro de los implantes