


Fractura de mandíbula

Tratamiento con placa y tornillos



Las fracturas de mandíbula pueden presentarse por traumatismo o ser secundarias a infecciones en el hueso y encía. Cuando son secundarias generalmente son resultado de un traumatismo leve o de una pelea con otro perro.

Existen varios métodos de reparación. La placa y tornillos ortopédicos tienen como ventaja que son implantes internos, pueden permanecer largo tiempo sin necesidad de retirarlos, permiten reconstruir de forma anatómica la fractura y dan buena estabilidad. La evolución de estos pacientes depende de los cuidados posquirúrgicos, edad y talla del paciente y presencia o ausencia de infección en el hueso.

Recomendaciones generales

- Realizar limpieza dental pre o posquirúrgica y dar antibióticos de amplio espectro
- Mediar de preferencia vía subcutánea (convenia antibiótico de depósito) o intramuscular, para evitar lastimar al paciente o luchar con él al darle medicamentos vía oral
- No utilizar analgésicos de personas nunca (aspirina, naproxen, ketorolaco)
- Evitar peleas con otros animales darles juguetes a morder o alimentos duros
- Administrar alimento blando para cachorro o alto en proteína (revoverly lata o a/d lata) puede ser también cualquier alimento enlatado o su alimento habitual pero previamente remojado para que este blando
- Se recomienda una revisión semanal o quincenal con su médico veterinario y mantener estos cuidados tres meses al menos
- A largo plazo puede haber aflojamiento de tornillos y después de cuatro meses los implantes pueden ser retirados sin problema