


# Información al propietario

## Sutura iliofemoral para tratamiento de luxación coxofemoral



La luxación coxofemoral es una lesión en la que la cabeza del fémur que es redonda sale de su sitio normal llamado acetábulo. Rompiendo ligamentos y tejidos que impiden mantenerla en su sitio nuevamente.

Existen varios métodos de tratamiento. La sutura iliofemoral consiste en colocar una sutura de nylon especial que va del fémur al hueso de la cadera llamado ilion y que mantiene la cabeza del fémur para que se forme tejido fibroso que mantenga la cabeza del fémur en su sitio de manera permanente.



Este proceso requiere de aproximadamente seis semanas, tiempo durante el cual el paciente requiere reposo moderado evitando correr, rodar sobre su espalda, jugar con otros perros y escaleras. La actividad debe limitarse a unos 10 metros cuadrados en una superficie plana, sin rejas o muebles a donde pueda saltar. A partir de la primera semana el paciente puede salir a caminar con correa sobre pasto periodos cortos de tiempo.

Si durante la recuperación el paciente no guarda reposo necesario y hay reluxación el paciente debe ser reoperado y solo tendrá opción a la escisión de la cabeza femoral (FHO) o un remplazo total de cadera.

### Cuidados posquirúrgicos generales

- Primera semana. Administrar al paciente el antibiótico y el analgésico que indique su médico veterinario los primeros 10 días. Nunca usar antiinflamatorios para personas (aspirina, naproxen, diclofenaco etc)
- Mantener la herida limpia y evitar que el paciente se muerda o lama la sutura, si esto sucede puede ser necesario colocarle un collar isabelino 10 días hasta que se retire a sutura. Si notan inflamación se pueden colocar compresas frías de gel 5 minutos una vez al día.
- Actividad limitada a permanecer en un sitio con piso plano no resbaloso con espacio para comer, dormir y defecar, sin escaleras ni otros perros.

- A partir de la segunda semana el paciente ya debe comenzar a apoyar el miembro operado si no es así acudir a revisión. Permitir al paciente salir a caminar con correa de preferencia en pasto pero sin que corra, salte o juegue con otros perros.
- A partir de la sexta semana previa revisión se permite el retorno del paciente a su actividad normal.
- En algunos casos entre meses o años después de la cirugía puede ser necesario retirar la sutura de nylon y el implante metálico, si notan una protuberancia cerca de la cadera de consistencia blanda reportarlo a su médico para retiro de implantes.