

TRATAMIENTO ANTI OSTEOARTRITICO INTEGRAL NORVET (TAOIN)

CONOZCA EL TRATAMIENTO ANTI-OSTEOARTRITICO INTEGRAL NORVET (TAOIN)



1

CONDRO-JET

Cada ml. contiene: Condroitin sulfato 120 mg.
4 mg/kg (0.33 ml por cada 10 kg de peso) I.M aplicados en el dorso
8 aplicaciones 2 veces por semana
Días : 0-4-7-11-14-18-21-25



2

CARTRY-JET

Cada ml. contiene: Hialuronato de sodio. 10 mg.
1 ml. hasta 19 kg de peso, 2 ml. de 20 kg. de peso en adelante
I.V. 3 aplicaciones semanales.
Días: 0-7-14



3

CARTI PET 'S PLUS

Como terapia inicial.

CARTI PET 'S PLUS 10

Cada tableta contiene: Glucosamina sulfato: 500 mg.; Condroitin sulfato: 100 mg.;
Acido hialurónico: 4 mg.; Vitamina C 50 mg.; Zinc 13 mg.; Manganeso 5 mg.; Cobre 2 mg.;
Acidos grasos Omega 3: 4 mg.; Acidos grasos Omega 6: 30 mg.; Vitamina E: 22 U.I.;
Meloxicam: 1 mg.; Ginkgo biloba: 50 mg.; Ginseng americano: 80 mg.
(1 tableta por cada 10 kg. de peso diariamente por 60 días).

CARTI PET 'S PLUS 20

Cada tableta contiene: Glucosamina sulfato: 500 mg.; Condroitin sulfato: 200 mg.;
Acido hialurónico: 6 mg.; Vitamina C: 50 mg.; Vitamina E: 22 U.I.; Cobre: 2 mg.; Zinc: 13 mg.;
Manganeso: 5 mg.; Meloxicam: 2 mg.; Acidos grasos Omega 3: 4 mg.;
Acidos grasos Omega 6: 30 mg.; Ginkgo biloba: 100 mg.; Ginseng americano: 160 mg.
(1 tableta por cada 20 kg. de peso diariamente por 60 días).



4

CARTI PET 'S

Cada tableta contiene: Glucosamina sulfato: 500 mg.; Condroitin sulfato: 200 mg.; Acido
hialurónico: 6 mg.; Cobre: 2 mg.; Manganeso: 5 mg.; Zinc: 15 mg.; Vitamina C: 50 mg.; Acidos
grasos Omega 3: 0.35 mg.; Acidos grasos Omega 6: 2.50 mg.; Ginkgo biloba: 100 mg.; Ginseng
americano: 160 mg.

Seguir administrando como terapia de sostén.

Se recomienda dieta, ejercicio, fisioterapia y rehabilitación.

(1 tableta por cada 20 kg. de peso diariamente como mantenimiento).



CONDRO-JET
CARTRY-JET
CARTI-PET 'S
CARTI-PET 'S PLUS



TAOIN

“El único tratamiento integral efectivo para la
osteoartritis canina”

TRATAR CON ÉXITO LA OSTEOARTRITIS CANINA


¡SÍ ES POSIBLE!

“El único tratamiento integral efectivo para la osteoartritis canina”

TAOIN: el tratamiento de las 4 c's estudiado y diseñado especialmente
para el tratamiento de las enfermedades articulares, ya que incluye:
Condromoduladores, lubricantes articulares, anti oxidantes y
analgésicos desinflamatorios



Laboratorios Norvet, S.A. de C.V.
Eje Central Lázaro Cárdenas No. 1122
Col. Portales Sur
C.P. 03300 México, D.F.
Tel.: 01800 714 9685
www.norvet.com.mx



Los padecimientos osteoarttríticos se deben a una disminución de la calidad del Liquido sinovial así como de los Glicosaminoglicanos y Colágeno que conforman la superficie articular, durante este proceso existe una deshidratación de los Glicosaminoglicanos que forman la red que contiene a las células del cartílago.



CONDRO-JET (Chondroitin sulfate)

Reg. SAGARPA Q-7827-213

El Chondroitin sulfate es un glicosaminoglicano sulfatado componente mayoritario de la matriz extracelular de la mayoría de los tejidos vertebrados y representa un elemento importante en el mantenimiento de la integridad estructural de los tejidos con una gran matriz extracelular (tejidos conectivos del cuerpo, cartílago, piel, vasos sanguíneos, así como los ligamentos y los tendones). Como parte del agregado, el chondroitin sulfate es el componente mayoritario del cartílago. El nivel de agregación y las fuertes cargas de los grupos sulfato del chondroitin sulfate le dan la propiedad de retención de agua a estos proteoglicanos, lo que provee al cartílago de su característica de resistencia a la compresión.

En las enfermedades articulares degenerativas, tales como la artrosis, se produce un deterioro y una pérdida del cartílago articular. Una fase clave en el proceso degenerativo artroscópico es la pérdida de proteoglicano (formado por chondroitin sulfate) del cartílago y la exposición de su red de colágeno a un mal funcionamiento mecánico.

La acción terapéutica del chondroitin sulfate en pacientes artroscópicos es debida a su efecto beneficioso sobre el desequilibrio metabólico ocurrido en el cartílago artroscópico. Los mecanismos de acción del chondroitin sulfate están descritos para los tres niveles de la articulación: cartílago, membrana sinovial y hueso subcondral.



CARTRY-JET (Ac. Hialurónico)

REG. SAGARPA Q-7827-283

El líquido sinovial está mayormente compuesto por Ácido Hialurónico y su principal función es la lubricación y nutrición de la superficie cartilaginosa.



CARTIPET'S PLUS

Cartipet's Plus 10

Reg. SAGARPA: Q-7827-307

Cartipet's Plus 20

Reg. SAGARPA: Q-7827-273

Cuando las células articulares se deshidratan, la fricción entre las superficies se incrementa y si el colágeno se fractura, el cartílago se edematiza y se fractura presentando fibrilación y condromalacia hasta que existe la eburnación o desprendimiento de la superficie articular. Estas células en acidosis con disminución del oxígeno necesitan de gran cantidad de antioxidantes y de sustancias que optimicen el metabolismo articular, sustancias naturistas como el GINKGO BILOBA y GINGSEN y vitamina E son sustancias ideales para mantener la articulación con un proceso degenerativo disminuido.

Después de la descomposición química de la fuente de nutrición del cartílago, viene una descomposición arquitectónica y la consecuente pérdida de la función de la articulación, si esta es intervertebral el núcleo pulposo del disco intervertebral pierde sus propiedades al deshidratarse y esto causa dolor e inflamación crónica que por la irritación y disminución del pH inicia con depósitos de calcio anormales además de la inflamación del hueso subcondral, cuando se vuelve crónica ocasionará alteraciones arquitectónicas óseas ocasionando así la osteoartritis. Esa inflamación crónica deberá ser tratada con algún antiinflamatorio no esterooidal, y al menos por 60 días continuos.

Además de los ingredientes Condroprotectores, Condromoduladores, Antioxidantes y AINES estas tabletas palatables cuentan con los beneficios que dan los Ácidos grasos, Vitaminas y Minerales.



CARTIPET'S

Reg. SAGARPA: Q-7827-270

Posteriormente a la evaluación del médico especialista se decide si el medicamento con AINES se discontinúa o se mantiene. Sin embargo el resto de los medicamentos deberán de seguir siendo administrados para que perdure el efecto, al hablar de medicamentos que modifican la actividad celular intra articular, deberán de ser utilizados al menos durante 6 meses para que cumplan con sus efectos y así lograr disminuir la degeneración celular, disminuir nunca detener o eliminar el proceso degenerativo.

La utilización profiláctica de CARTIPET'S en cachorros de rápido crecimiento entre 3 y 9 meses de edad ayuda a evitar o disminuir las enfermedades óseas y articulares causantes de la Osteoartritis en meses futuros.

